

## سیستم کیسه‌ای دو تکه

### وضعیت پوست را بررسی کنید



3

بررسی کنید تا مطمئن شوید که پوست اطراف استومای شما (بریستومال) سالم و بدون تحریک، جوش یا فرمزی است.\*

\*اگر متوجه تحریک، جوش یا فرمزی شوید، با پرستار WOC خود تماس بگیرید  
NSWOC

### پوست را تمیز و خشک کنید



2

### سیستم کیسه‌ای استفاده شده را بردارید




1

پوست را با آب با صابون ملائم طبق توصیه مختص مرآقبت‌های سلامت تمیز کنید. کاملاً با آب بشویید و خشک کنید. از مواد روغنی، پودر، لوسیون یا صابون‌هایی از نوع لوسیون روی پوست استفاده نکنید.

یک لبه چسب را با دقت بالا بیاورید و نوار محافظ آن را به سمت پایین جدا کنید و به‌آرامی پوست را به سمت بیرون چسب پایه محافظ پوست فشار دهید. کیسه و چسب پایه محافظ پوست استفاده شده را بطور مناسب دور بیندازید. آن را داخل توالت نیندازید.

### لوازم اوری کنید جمع اوری کنید



7

لایه محافظ چسب را از چسب پایه محافظ پوست جدا کنید.



6



5



4

دهانه اندازه چسب مشخص شده را روی چسب پایه محافظ پوست رسم کنید. چسب پایه محافظ پوست باید در محل تلاقی پوست پوست مطابق با الگو برش دهد. فراتر از خط روی لایه محافظ چسب نبرید. با استفاده از قیچی منحنی کوچک، با دقت سوراخی را در چسب پایه محافظ پوست مطابق با الگو برش دهد. بررسی کنید که هچ پوستی بین چسب پایه محافظ پوست و استوما دیده نشود تا از نشت ترشحات و ایجاد تحریک پوستی جلوگیری شود.

### از سیستم کیسه‌ای جدید استفاده کنید



11



10



9



8

برای اینکه چسب به بهترین شکل بچسبد، حدود یک دقیقه چسب پایه محافظ پوست را به صورت آرام فشار دهید.

دهانه چسب پایه محافظ پوست را به شکل لوزی روی مرکز استوما قرار دهید. برای چسب‌هایی با حاشیه نواری، پوشش کاغذی را از هر دو طرف بردارید و چسب را روی پوست فشار دهید.

اگر از کیسه اروستومی استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که دریچه تخلیه بسته است. علامت قطره روی دریچه تخلیه باید به آن سمت کیسه باشد که روی بدن قرار می‌گیرد.

در صورت تمایل، از درپوش ارائه شده درون جعبه استفاده کنید.



نه کیسه را بیندید. اگر از کیسه قابل تخلیه‌ای استفاده می‌کنید، تمدد میکروسیل Lock 'n Roll را در پایین کیسه بیندید یا از گره کیسه استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این سیستم تمدد، به نکات مراقبت از تمدد میکروسیل Lock 'n Roll مراجعه کنید.



12

## سیستم کیسه‌ای دوتکه

شماره موجودی	فهرست محصولات	نکات
	<b>سیستم کیسه‌ای دوتکه</b>	
	چسب پایه محافظ پوست	پوست اطراف استومای شما نباید دارای هیچگونه علائم جوش باشد
	کیسه	از خم باشد
	<b>لوازم جانبی</b>	
	حلقه‌های محافظ	پوست تحریکشده باید توسط متخصص مراقبت‌های سلامت ارزیابی شود
	کمربند استومی	
	خمیر	اگر از حلقه یا خمیر محافظ استفاده می‌کنید، آن را طبق دستور العمل، روی قسمت چسبنده چسب پایه محافظ پوست در کنار دهانه استوما قرار دهید
	دئودورانت روان‌کننده	احتمالاً استومای شما پس از جراحی متورم خواهد شد. ممکن است چند هفته یا چند ماه طول بکشد تا استوما کوچک شود و به اندازه ثابتی برسد
	پودر استوما	ممکن است استوما هنگام تمیز کردن آن کمی خون‌ریزی کند
	سایر موارد	استفاده از دستمال‌های مرطوب محافظ پوست زیر چسب‌های پایه با ماندگاری طولانی توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است این کار زمان ماندگاری کیسه را کاهش دهد

## دستورالعمل‌های تکمیلی

Hollister Australia  
PO Box 375,  
Box Hill, VIC 3128  
[www.hollister.com.au](http://www.hollister.com.au)

Customer Care  
1800 880 851  
[priority@hollister.com.au](mailto:priority@hollister.com.au)

Hollister New Zealand  
PO Box 107097,  
Auckland Airport, Auckland 2150  
[www.hollister.co.nz](http://www.hollister.co.nz)

Customer Care  
0800 678 669  
[NZCustomerService@libmed.co.nz](mailto:NZCustomerService@libmed.co.nz)

قبل از استفاده از چسب پایه محافظ پوست، پوست باید تمیز و خشک باشد.

قبل از استفاده، حتماً دستورالعمل‌های استفاده را مطالعه کنید تا درباره موارد استفاده، موارد منع مصرف، هشدارها، اقدامات احتیاطی و دستورالعمل‌ها اطلاعات کسب کنید.

لوگو Hollister Incorporated و Lock 'n Roll، علائم تجاری Healthy skin. Positive outcomes. هستند.  
© 2022 Hollister Incorporated. 923081-1118 ANZ Farsi-2P