

## مراقبت‌های روزانه استومی

### نکات سیستم کیسه‌ای

- قبیل از اینکه سیستم کیسه‌ای قبایلی را بردارید، سیستم کیسه‌ای جدید را آماده کنید
- کیسه خود را زمانی که ۱/۲ تا ۱ آن از ترشحات یا باد معده پر شده است خالی کنید. اجازه ندهید کیسه بیش از حد پر شود
- کیسه خود را قبل از فعالیت‌ها و قبل از خواب خالی کنید
- اگر متوجه شدید که باد معده زیادی در کیسه خود دارید (کولوستومی یا ایلئوستومی) ممکن است بخواهید از کیسه فیلتردار استفاده کنید
- بهترین زمان برای تغییر روزانه سیستم کیسه‌ای، صبح و قبل از خوردن یا نوشیدن است
- پس از چسباندن چسب پایه محافظ پوست، آن را به‌آرامی برای یک دقیقه روی پوست خود فشار دهید تا بهترین چسبندگی را داشته باشد. فشار ملایم و گرما به تماس اولیه کمک می‌کند
- اگر از سیستم کیسه‌ای دوتكه استفاده می‌کنید، سعی کنید چسب پایه محافظ پوست را به شکل لوزی روی بدن خود قرار دهید تا بدون مشکل در جای خود قرار بگیرد

### نکات مراقبت از پوست

- به پاد داشته باشید، هنگام مراقبت از پوست اطراف استوما، بهتر است افراط به خرج ندهید
- در اکثر موارد، آب برای تمیز کردن پوست کافی است. به پاد داشته باشید که پس از تعویض یا خالی کردن کیسه، دست‌های خود را بشویید
- اگر به صابون نیاز دارید، از صابون ملایمی استفاده کنید که حاوی کرم یا لوسيونی نباشد که احتمال باقی ماندن لاشه‌ای از آن روی پوست شما وجود داشته باشد. این امر ممکن است مانع چسبندگی چسب شود
- استفاده از دستمال‌های مرتبط محافظ پوست زیر چسب‌های پایه با ماندگاری طولانی توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است این کار زمان ماندگاری کیسه را کاهش دهد
- قبیل از چسباندن چسب پایه محافظ پوست، مطمئن شوید که پوست پریستومال تمیز و خشک است
- مواردی که برای مراقبت‌های معمول از پوست اطراف استوما توصیه نمی‌شود: صابون حاوی لوسيون، کرم، لوسيون، پودر، دستمال مرتبط کودک، ایزوپروپیل الکل، داروهای استرتوئیدی یا پماد
- تحریک پوست «طبیعی» نیست. اگر متوجه قرمزی، ترکخوردگی یا تحریک در پوستان شدید، از متخصص مراقبت‌های بهداشتی واجد شرایط مانند یک پرستار WOC/ET کمک بگیرید

### نکات روزانه

- چسب پایه محافظ پوست را به صورت روزمره تغییر دهید. بعد از اینکه پاد گرفتید چه چیزی برای شما بهتر است، احساس راحتی بیشتری با این موضوع خواهید داشت
- مدت استفاده از کیسه بر اساس اولویت‌های شخصی و ویژگی‌های استوما است، اما مدت طبیعی آن سه یا چهار روز در نظر گرفته می‌شود
- اگر زمان استفاده شما از کیسه نامنظم یا غیرقابل پیش‌بینی شد، با پرستار WOC/ET خود مشورت کنید
- ممکن است در فصول گرما که بیشتر عرق می‌کنید یا در زمان‌هایی که فعالیت‌تان افزایش می‌یابد، زمان ماندگاری چسب پایه محافظ پوست کاهش پاید
- هنگام سفر، از قبیل برنامه‌ریزی کنید. برخی از پیشنهادها عبارت‌اند از: هنگام پرواز، لوازم اضافی بردارید، محصولات استومی خود را در کیف دستی خود بگذارید، چسب‌های پایه محافظ پوست را از قبیل برش دهید تا نیازی به حمل قیچی در هوایپما نداشته باشید، و یک شناخته مسافرتی دریافت کنید که نیاز شما به لوازم خاص در هنگام سفر در آن توضیح داده شده باشد
- می‌توانید هنگام استفاده یا عدم استفاده از سیستم کیسه‌ای دوش بگیرید یا حمام کنید
- اگر از سیستم کیسه‌ای دو تکه استفاده می‌کنید، می‌توانید برای راحتی‌تان هنگام دوش گرفتن، از کیسه دیگری استفاده کنید تا کیسه‌ای که استفاده می‌کنید خشک بماند
- هنگام خالی کردن کیسه، شستشوی آن ضروری نیست. دئودورانت روان‌کننده ممکن است تخلیه را آسان‌تر کند. از ریختن مواد روغنی یا اسپری‌های پخت‌وپز روی کیسه استومی خودداری کنید
- لوازم اضافی خود را در جای خشک و خذک نگهداری کنید
- پیگیری روزمره با پرستار WOC/ET توصیه نمی‌شود

## مراقبت‌های روزانه استومی

اصطلاحات متداول	
باد معده را از کیسه خارج می‌کند و بوی بد آن را جذب می‌کند. در کیسه‌های تمپسنته و قابل تخلیه به عنوان گزینه ویژه وجود دارد	فیلتر
کیسه‌ای که مواد خروجی را از استوما جمع‌آوری می‌کند. بر اساس نوع استومی شما، کیسه از نوع قابل تخلیه، تمپسنته و ارستومی است	کیسه
شامل چسب پایه محافظ پوست و کیسه است. گزینه‌های در دسترس، سیستم کیسه‌ای یکتکه یا سیستم کیسه‌ای دو تکه است. حاشیه نواری یکپارچه در اطراف چسب پایه محافظ پوست باعث افزایش استحکام آن می‌شود	سیستم کیسه‌ای
بخشی از سیستم کیسه‌ای شما که درست در اطراف استومای شما قرار می‌گیرد. از پوست شما مراقبت می‌کند و سیستم کیسه‌ای را سر جای خود نگه می‌دارد. گاهی اوقات ویفر یا فلنچ نیز نامیده می‌شود	چسب پایه محافظ پوست
مدت زمانی که می‌توان سیستم کیسه‌ای را قبل از خراب شدن آن استفاده کرد. زمان‌های ماندگاری ممکن است متغیر باشد اما باید برای هر فرد نسبتاً ثابت باشد	زمان ماندگاری
پرستاری با تحصیلات تکمیلی که در مراقبت از استومی تخصص دارد. گاهی اوقات پرستار ET (درمان انترستومال) نامیده می‌شود.	پرستار WOC (زخم، استومی، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع)

سایر توصیه‌های متخصص مراقبت‌های سلامت من:

---



---



---



---



---



---

Hollister Australia  
PO Box 375,  
Box Hill, VIC 3128  
[www.hollister.com.au](http://www.hollister.com.au)

Hollister New Zealand  
PO Box 107097,  
Auckland Airport, Auckland 2150  
[www.hollister.co.nz](http://www.hollister.co.nz)

Customer Care  
1800 880 851  
[priority@hollister.com.au](mailto:priority@hollister.com.au)

Customer Care  
0800 678 669  
[NZCustomerService@libmed.co.nz](mailto:NZCustomerService@libmed.co.nz)

پیگیری روزمره با متخصص مراقبت‌های سلامت خود توصیه می‌شود.

قبل از استفاده از محصولات/لوازم جانبی استومی، حتماً تمام مندرجات و برچسب‌های محصول را بخوانید.

لوگوی Secure Start، Hollister Incorporated و „Healthy skin. Positive outcomes.“ عالم تجاری Hollister هستند.  
© 2022 Hollister Incorporated. 923077-1117 ANZ Farsi-OstCare